

มหันตภัย โรคใบด่างมันสำปะหลัง

อาการ :



ใบด่างเหลือง ฝิดรูป
ยอดแตกใหม่ แสดงอาการด่างเหลืองชัดเจน
ลำต้นแคะแกร็น
ไม่เจริญเติบโต

การแพร่ระบาด :



1. ท่อนพันธุ์
จากต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค
2. แมลงหึ่งขาวยาสูบ
นำเชื้อไวรัสจากต้นเป็นโรค
ไปสู่ต้นปกติ

การปฏิบัติเพื่อกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง



1. **สำรวจแปลงมันสำปะหลังของตนเองอย่างสม่ำเสมอ**
หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่าง
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้เคียงทันที

2. **กำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหึ่งขาวยาสูบ**

- ☞ ทอนทำลายต้นที่เป็นโรค
- ☞ พ่นสารเคมีกำจัดแมลงหึ่งขาวยาสูบ ดังนี้
 - อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
 - ไดโนทีฟูเรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
 - ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

3. **คัดเลือกท่อนพันธุ์สะอาด**

ใช้ท่อนพันธุ์จากแปลงที่ไม่เคยเป็นโรค
หรือใช้ท่อนพันธุ์ที่ทราบแหล่งที่มา

ความเสียหาย :

มันสำปะหลังไม่สร้างหัว
หัวสืบลึก หรือหัวไม่มีแป้ง
ผลผลิตลดลง
หากเป็นโรคตั้งแต่ระยะต้นเล็ก
**จะเสียหายถึง
80-100%**



กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง